

Allgemeine Impfinformationen

Impfstoffe:

Revaxis: Diphtherie/Tetanus/Polio

Grundimmunisierung: 3 Impfungen. Tag 0, nach 1 Monat, nach 1 Jahr.

Auffrischung alle 10 Jahre.

Früher wurde mit Lebendimpfstoff geimpft. Daher können ältere PatientInnen die Impfungen auch nach einem Zeitraum von über 10 Jahren noch auffrischen.

Repevax: Diphtherie/Tetanus/Polio/Pertussis

Grundimmunisierung: 3 Impfungen. Tag 0, nach 1 Monat, nach 1 Jahr.

Auffrischung alle 10 Jahre.

Früher wurde mit Lebendimpfstoff geimpft. Daher können ältere PatientInnen die Impfungen auch nach einem Zeitraum von über 10 Jahren noch auffrischen.

Twinrix: Hepatitis A+B

Grundimmunisierung; 3 Impfungen. Tag 0. nach 1 Monat, nach ½ Jahr.

Auffrischung Hepatitis B nach 5 Jahren. Hepatitis A nach 10 Jahren.

Engerix B 20: Hepatitis B

Grundimmunisierung; 3 Impfungen. Tag 0. nach 1 Monat, nach ½ Jahr.

Auffrischung nach 5 Jahren

Havrix 1440: Hepatitis A

Grundimmunisierung; 2 Impfungen. Tag 0. nach ½ Jahr.

Auffrischung nach 10 Jahren

MMRvaxpro: Masern/Mumps/Röteln

Bei nicht durchgemachten Erkrankungen sind 2 Impfungen nötig. Tag 0 und die Folgeimpfung nach Ermessen des Arztes

Bei durchgemachten Erkrankungen genügt eine Auffrischung.

TyphimVI: Typhus

Eine Impfung alle 3 Jahre, Impfung nur empfohlen bei Reisen in entsprechende Länder.

Dukoral: Cholera

Ist eine orale Impfung. 2 Impfdosen innerhalb von ein paar Tagen, 1. Auffrischung nach 3 Monaten, die nächste nach 5 Jahren. Impfung nur empfohlen bei Reisen in entsprechende Länder. Bietet keinen vollständigen Schutz.

Mencevax: Meningokokken

Eine Impfung alle 3 Jahre, Impfung nur empfohlen bei Reisen in entsprechende Länder.

Menveo: Meningokokken

Eine Impfung, Auffrischung vor der Reise in entsprechende Länder.

Rabipur: Tollwut

Grundimmunisierung: 3 Impfungen; Tag 0, Tag 7, Tag 21.

Auffrischung: alle 5 Jahre

Ixiaro: Japan B

Grundimmunisierung: 2 Impfungen: Tag 0, Tag 21.

Auffrischung alle 3 Jahre

Malarone: Malaria

Als Prophylaxe 1 Tag vor der Einreise und bis eine volle Woche nach der Ausreise aus entsprechenden Ländern. 1 Tablette pro Tag.

Als stand-by: Bei Auftreten eines hohen Fieberschubs in einem solchen Gebiet/Land an 3 aufeinanderfolgenden Tagen je 4 Tabletten.

Zur Malariabekämpfung gibt es verschiedene Präparate, wie z.B. Tetrazykline, Lariam.

Encepur/FSME: Zecken

Grundimmunisierung: 3 Impfungen: Tag 0, Tag 30, nach 12 Monaten.

Auffrischung: alle 5 Jahre.

Sandovac/Inflexal/Vaxigrip: Grippe

Jährliche Impfung, sollte jeden Herbst vorgenommen werden.

Pneumovac: Lungenentzündung

Einmalige Impfung alle 5 Jahre.

Bei sämtlichen Impfungen empfiehlt es sich, ab dem 60. Lebensjahr – nach der Empfehlung des Arztes – die Impfabstände zu reduzieren. Das Immunsystem bildet weniger Antikörper, daher ist der Impfschutz nur für einen kürzeren Zeitraum gegeben.