


Lineare Systeme erster Ordnung

1. *Dreidimensionale Drehbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit:* Sei V ein dreidimensionaler, orientierter, reeller Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Für ein festes $n \in V$ ist die Abbildung $L_n : V \rightarrow V, v \mapsto n \times v$ linear. Hier bezeichnet $n \times v$ das Vektorprodukt von n mit v . (Dazu werden Skalarprodukt und Orientierung benötigt.) Sei nun $|n| = 1$ und $\omega \in \mathbb{R}$.



Das Drehvektorfeld L_{e_3}

- (a) Sei $\gamma_v : \mathbb{R} \rightarrow V$ mit $\gamma_v(t) = n \langle n, v \rangle + \cos(\omega t) (v - n \langle n, v \rangle) + \sin(\omega t) n \times v$. Zeigen Sie, dass γ_v die maximale Lösung des Systems $\dot{\gamma} = \omega L_n(\gamma)$ mit $\gamma_v(0) = v$ ist. Welche Bahn hat γ_v ? Hinweis: $a \times (b \times c) = b \langle a, c \rangle - c \langle a, b \rangle$.
- (b) Kontrollieren Sie durch Summieren der Exponentialreihe, dass $\gamma_v(t) = (\exp(t\omega L_n)) v$.
- (c) Zeigen Sie für die Beschleunigung $b_v(t) := \frac{d^2 \gamma_v}{dt^2}(t)$, dass $b_v(t) = -\omega^2 (\gamma_v(t) - n \langle n, \gamma_v(t) \rangle)$. Es gilt also $\langle \dot{\gamma}_v(t), n \rangle = \langle \dot{\gamma}_v(t), \gamma_v(t) \rangle = \langle b_v(t), \dot{\gamma}_v(t) \rangle = \langle b_v(t), n \rangle = 0$.
2. *Spin-1/2-System:* Es sei V ein zweidimensionaler komplexer Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Für die Vektoren $e_1, e_2 \in V$ gelte $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$ und für die lineare Abbildung $\sigma : V \rightarrow V$ gelte $\sigma e_1 = e_2$ und $\sigma e_2 = e_1$.

- (a) Zeigen Sie mittels $\sigma^2 = id$ und Aufsummieren der Exponentialreihe, dass¹

$$\Phi : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, \quad (t, v) \mapsto e^{(-it\sigma)} v = \cos(t) v - i \sin(t) \sigma v =: U(t)v.$$

- (b) Kontrollieren Sie $\langle U(t)v, U(t)w \rangle = \langle v, w \rangle$ für alle $v, w \in V$ und für alle $t \in \mathbb{R}$. (Unitarität)

- (c) Zeigen Sie $|\langle U(t)e_1, e_1 \rangle|^2 = \cos^2(t)$.

3. *Bahnen der Lorentzgruppe:* Für die Abbildung $X : \mathbb{R}^{2 \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 1}$ gelte

$$X : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie für die Menge L aller maximalen Lösungen des Systems $\dot{\gamma} = X(\gamma)$


$$L = \left\{ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 1}, \quad t \mapsto \begin{pmatrix} \cosh(t) & \sinh(t) \\ \sinh(t) & \cosh(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \right\}.$$

- (b) Skizzieren Sie die Bahnen der maximalen Lösungen, die bei $t = 0$ durch die Punkte $(1, 0)^t$, $(0, 1)^t$ und $(1, 1)^t$ gehen. Die Bahn durch $(1, 0)^t$ ist die Menge

$$\left\{ \begin{pmatrix} \cosh(t) & \sinh(t) \\ \sinh(t) & \cosh(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

¹ Φ ist also der maximale Fluss des Systems $i\dot{\gamma} = \sigma\gamma$.

Die anderen Bahnen sind analog zu bilden. Ist $(0, 0)^t$ in der Bahn durch $(1, 1)^t$ enthalten?
 Bemerkung: Die Bahn durch $(0, 1)^t$ ist die Weltlinie eines gleichmäßig beschleunigten relativistischen Massenpunkts. Welche Geschwindigkeit bezüglich des gewählten Koordinatensystems hat dieser Massenpunkt bei $t = 1$?



Das Vektorfeld zu X