

Beispiele für Lösungen von $\square_2 A = j$

1. Seien $k, \delta \in \mathbb{R}$. Gesucht ist $A \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ mit $\square A \equiv (c^{-2}\partial_t^2 - \partial_x^2)A = 0$ zur Anfangsvorgabe $A(0, x) = \sin(kx + \delta)$ und $\partial_t A(0, x) = 0$ auf \mathbb{R} . Ist A eine Stehwelle, dh: existieren Funktionen $f, g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R} : \mathbb{R})$, sodass $A(t, x) = f(t) \cdot g(x)$ für alle $(t, x) \in \mathbb{R}^2$? *Lösung:* A ist eine Stehwelle und es gilt $A(t, x) = \cos(ckt) \sin(kx + \delta)$.




Figure 1: Momentaufnahmen von $\cos(ckt) \sin(kx)$

2. Sei $a \in \mathbb{R}$. Berechnen Sie $A \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ mit $\square A = 0$ und der Anfangsvorgabe $A(0, x) = 0$ und $\partial_t A(0, x) = ac/(a^2 + x^2)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. *Lösung:* $A(t, x) = \frac{1}{2} [\arctan(\frac{x+ct}{a}) - \arctan(\frac{x-ct}{a})]$. Ist A , siehe Fig 2 und 3, eine Stehwelle?




Figure 2: Momentaufnahmen $A(t, \cdot)$ aus Bsp 2 für $c|t|/a \in \{1, 5, 10, 20, 30\}$




Figure 3: Graph der Lösung von Bsp 2

3. Sei $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R} : \mathbb{R})$. Für welche Funktionen $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist die Lösung A von $\square A = 0$ zur Anfangsbedingung $(A(0, x), \partial_t A(0, x)) = (u, v)$ rechtsläufig? *Lösung:* Genau dann, wenn $v = -cu'$. In diesem Fall gilt $A(t, x) = u(x - ct)$ für alle $(t, x) \in \mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie eine rechtsläufige Lösung von $\square A = 0$ mit $\partial_t A(0, x) = ac/(a^2 + x^2)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. *Lösung:* $A(t, x) = -\arctan(\frac{x-ct}{a})$. Siehe Fig 4.
4. Für die Funktion $j \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ gelte $\square j = 0$. Geben Sie ein $A \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ mit $\square A = j$ an. *Hinweis:* Für $j(t, x) = f(x - ct)$ suchen Sie A mit dem Ansatz $A(t, x) = (x + ct) \cdot F(x - ct)$. Ähnliches tun Sie für $j(t, x) = g(x + ct)$. Geben Sie die Menge aller Funktionen $A \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ mit $\square A = j$ an. *Lösung:* $\ker(\square - j) = A_p + \ker \square$ mit

$$A_p(t, x) = -\frac{1}{4} [(x + ct) F(x - ct) + (x - ct) G(x + ct)] \text{ und } j(t, x) = F'(x - ct) + G'(x + ct).$$




Figure 4: Momentaufnahmen von $\arctan \frac{x-ct}{a}$

Anmerkung: Auch die Funktionen $\tilde{A}_p, \hat{A}_p \in C^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ mit

$$\tilde{A}_p(t, x) = -\frac{x}{2} [F(x-ct) + G(x+ct)] \quad \text{und} \quad \hat{A}_p(t, x) = -\frac{ct}{2} [F(x-ct) - G(x+ct)]$$

erfüllen $\square A = j$, da $A_p - \tilde{A}_p$ und $A_p - \hat{A}_p$ (beinahe offensichtlich) in $\ker \square$ liegen.

5. Seien $\omega, q \in \mathbb{R}_{>0}$. Geben Sie ein $A \in C^2(\mathbb{R}^2 : \mathbb{R})$ mit $\square A(t, x) = \sin(\omega t) \sin(qx)$ für alle $(t, x) \in \mathbb{R}^2$ an. *Hinweis:* Versuchen Sie den Ansatz $A(t, x) = \sin(\omega t) g(x)$. *Lösung:*

$$A(t, x) = \sin(\omega t) \cdot \begin{cases} \frac{\sin(qx)}{q^2 - k^2} & \text{für } q \neq \omega/c =: k \\ x \frac{\cos(qx)}{2q} & \text{für } q = \omega/c \end{cases}$$

Vergleichen Sie im resonanten Fall $q = \omega/c$ die Lösung A mit \tilde{A}_p aus Beispiel 5. Siehe Fig 5.




Figure 5: Momentaufnahmen der resonanten Stehwelle \tilde{A}_p von Bsp 5

6. *Freiwillig.* Ein Weihnachtspäckchen, prall gefüllt mit Lichtwellen¹: Seien $a > 0, q > 0$ und $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $A(t, x) = f(x-ct)$, wobei $f(x) = a^4 \cos(qx) / (a^4 + x^4)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass eine Funktion $C : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ existiert, sodass

$$A(t, x) = \int_0^\infty C(k) \cos(k(x-ct)) dk.$$

Berechnen Sie C über die Fouriertransformierte von f mittels Residuensatz.




Figure 6: Das Wellenpaket f von Bsp 5 für $qa = 6\pi$

¹Typische Werte für thermisch erzeugtes Licht sind $q = 2\pi \cdot 2 \cdot 10^6 \text{ m}^{-1}$ und $a = 1 \text{ m}$.